Epidémiologie des AEV en Ile-de-France

Résultats de la surveillance des situations d'exposition sexuelle en Idf 2016 / InterCorevih francilien – GERES

Réunion Commission AEV InterCorevih – 16/11/2017 V.22/11/2017





Participation

Corevih	Sites	Expos Sex (n)
Nord	1	373
Ouest	11	561
Est	15	601
Centre	1	500
Sud	2	183
Total	30	2 218

Caractéristiques personne exposée (1)

	Au global	Détail par Corevih
Sexe, n (%) N=2218 SR (H/F)	H: 1743 (78,6) F: 468 (21,1) T: 7 (0,3) SR: 3,7	N: 7,1 O: 2,2 E: 4,4 C: 5,0 S: 2,6
Age, moy (min ;max) N=2216	33 (13 ;77)	N: 33 (18;69) O: 32 (13;77) E: 33 (15;69) C: 35 (17;72) S: 32 (16;69)
Viol , n (%) N=2218	Y = 106 (4,8) N = 1 780 NR = 332 (15,0)	N: 8 (2,1); NR=8 O: 75 (13,4)* E: 11 (1,8); NR=323 C: 11 (2,2); NR=1 S: 1 (0,5)
Travailleur du sexe, n (%) N=1117	Y = 30 (2,7) N = 1 076 NR = 11 (1,0)	N: 14 (3,8); NR=5 O: 13 (2,3); NR=6 E: ?** C: *** S: 3 (1,7)

^{*:} UMJ Garches;

^{**:} champ « personne exposée » ou « personne source » ? [Y=50 ; N=192 ; NR-Inconnu=359]

^{***:} Item absent

Caractéristiques personne exposée (2)

	Au global	Par Corevih
Absence préservatif, n (%) N=2 177 (- SO=41)	954 (<mark>43,8</mark>) NR = 205 (9,4)	N: 168 (45,0) [NR=6] O: 271 (49,5) [NR=34;SO=13] E: 227 (37,8) [NR=161] C: 253 (50,6) [NR=3] S: 35 (22,6) [NR=1; SO=28]
Accident préservatif, n (%) N=2 177	1 018 (46,8)	N: 199 (53,4) O: 243 (44,3) E: 213 (35,4) C: 244 (48,8) S: 119 (76,8)
ATCD de TPE , n (%) N=2 218	Y = 387 (17,4) N = 1362 (61,4) NR= 469 (21,1)	N: 67 (18,0) [NR=2] O: 63 (11,2) [NR=144] E*: 80 (13,3) [NR=321] C: 169 (33,8) [NR=2] S: 8 (4,4)
Déjà utilisé PrEP, n (%) N=1 617	Y = 12 (0,7) N = 1 482 (91,7) NR = 123 (7,6)	N: 4 (1,1) [NR=3] O: 0 [NR=7] E: ** C: 8 (1,6) [NR=113] S: 0

^{*:} Item « Exposition antérieure au VIH »;

^{**:} Item absent

Caractéristiques partenaire source (1)

	Au global	Par Corevih
Sexe , n (%) N = 1949 (-NR=269)	H: 1336 (68,5) F: 588 (30,2) T: 25 (1,3)	N: 2,5 [NR=1] O: 1,7 [NR=3] E: 1,84 [NR=163] C: 5,01 [NR=1] S: 0,76 [NR=101]
SR (H/F) UDI, n (%) N = 1718 (- Centre)	SR: 2,3 Y = 8 (0,5) N = 1 141 NR = 569 (33,1)	N: 4 (1,1) [NR=13] O: 3 (0,5) [NR=442] E: 1 (0,2) C: Item absent [NR=500] S: 0 [NR=114]
Partenaire sexuel occasionnel n (%) N = 2218	Y = 1 651 (74,4) N= 157 NR = 410 (18,5)	N: 335 (89,8) [NR=12] O: 513 (91,4) [NR=5] E: 298 (49,6) [NR=278] C: 447 (89,4) [NR=1] S: 58 (31,7) [NR=114]
Travailleur du sexe, n (%) N=1718 (- Centre)	Y = 194 (11,3) N = 866 NR= 658 (38,3)	N: 62 (16,6) [NR=24] O: 66 (11,8) [NR=155] E: 50 (8,3) [NR=359] C: Item absent [NR=500] S: 16 (8,7) [NR=120]
Originaire Pays endémique n (%) N=1718 (- Centre)	Y = 86 (5,0) N = 981 NR = 651	N: 32 (8,6) [NR=36] O: 26 (4,6) [NR=484] E: 0 C: Item absent [NR=500] S: 28 (15,3) [NR=131]

Caractéristiques partenaire source (2)

	Au global	Par Corevih
AgHBs, n (%) N=2218	Positif: 4 Negatif: 59 Guéri: 5 Inconnu: 2150 (96,9)	Inconnu/NR: N: 369 (98,9) O: 542 (96,6) E: 595 (99,0) C: 470 (94,0) S: 174 (95,1)
VHC, n (%) N=2218	Positif: 5 Negatif: 67 Guéri: 1 Inconnu: 2145 (96,7)	Inconnu/NR: N: 366 (98,1) O: 542 (96,6) E: 592 (98,5) C: 476 (95,2) S: 169 (92,3)
VIH, n (%) N=2218	Positif: 206 (9,3) Negatif: 107 Inconnu: 1905 (85,9)	Inconnu/NR: N: 303 (81,2) O: 508 (90,6) E: 527 (87,7) C: 424 (84,8) S: 143 (78,1)
Si VIH+, prise d'ARV ? n (%) N=206 (* Item Centre = « ATCD de TPE »)	Oui : 101 (49,0) Non : 41 (19,9) NR : 64 (31,1)	N: 30/4/21 O: 17/1/3 E: 21/3/34 C*: 18/33/0 S: 15/0/6
Si VIH+, CV indétectable ? n (%) N=155*	Oui : 66 (42,6) Non : 12 (7,7) NR : 77 (49,7)	N: 14/8/33 O: 13/3/5 E: 28/0/30 C*: Item absent S: 11/1/9

Evaluation initiale (1)

Corevih	Délai consultation : n (%)					
	Dans les 24H	24-48H	>48H	NR		
Nord	211	115	16	31		
Ouest	388	116	52	5		
Est	461	82	58	0		
Centre	394	56	30	20		
Sud	37	96	50	0		
N=2 218	1 491 (67,2)	465 (21,0)	206 (9,3)	56 (2,5)		

Evaluation initiale (2)

Corevih	Service consulté, n (%)				
	SAU	Réft	Autre &NR		
Nord	249	114**	10		
Ouest	365	185***	11		
Est	239	362			
Centre*	286	214			
Sud	65	117	1		
N = 2 218	1204 (54,3)	992	22		

^{* :} Centre (Data MIT) : Item «Ttt initié aux Urgences ? Y/N » - (si N, considéré dans Sce référent ?)

^{**:} Services SMIT et CeGIDD

^{***:} dont UMJ (n=49)

Evaluation initiale (3)

Corevih	Taux prescription initiale TPE, %					
	Au global	SAU	Réfts	Autres Sces		
Nord	95,7 (357/373)	97,6 (243/249)	91,4 (106/116)	(8/0)		
Ouest	91,4 (513/561)	92,9 (339/365)	88,1 (163/185)	(11/0)		
Est	66,2 (398/601)	75,7 (181/239)	59,9 (217/362)			
Centre	88,6 (443/500)	99,7 (285/286)	73,8 (158/214)			
Sud	84,7 (156/183)	98,5 (64/65)	76,9 (91/117)	(1/0)		
Total	84,2 (1867/2218)	92,4 (1112/1204)	73,9 (735/994)	(20/0)		

Evaluation initiale (4)

Corevih	Type de TPE, n (%)							
	Stribild	Combi/LPV/r	Truvada/Ralte	Truvada/DRV/r	Truvada/LPV/r	Combi/Ralte	Autre	NR
Nord	297 (83,2)	2	2	26	20		5*	5
Ouest	328 (63,9)	18	17	138 (26,9)	7		1 (NR)	4
Est	40	5	1	306 (76,9)	38		8**	
Centre		NR (n=443)						
Sud	1		82 (52,9)	67 (43,2)	2			4
Total (1424)	666 (46,8)	25	102	537 (37,7)	67		14	13

^{*} Atripla (1); Triumeq (1); TVD/DTG (1); TVD/Edurant (1); CBV/IDV/r (1)

^{**} TVD (2); Tivicay (1); Eviplera (2); TVD/Prezista (2); Atripla (1)

Suivi (1)

Corevih	TPE (n)	Arrêt prématuré du TPE, n (%)			
		Non	Oui	NR	
Nord	357	161	49	147	
Ouest	513	139	79	295	
Est*	398	281	95	22	
Centre	443	98	38	307	
Sud	156	59	17	80	
Total	1867	738 (39,5)	278 (14,9)	851 (<mark>45,6</mark>)	

^{*} Pas arrêt prématuré ttt et durée non renseignée dans 251 cas : durée considérée = 28 J ?

Suivi (2)

Corevih	Total (n)	Motif d'arrêt prématuré du TPE, n (%)				
		Décision patient	Effets II	Pas indication	Autre	NR
Nord	49	3	4	14		28
Ouest	79	5		44	4 (NR)	26
Est*	95*	2	8	85*		
Centre	[38]			NR		
Sud	17	1		10	1	5
Total	240	11	12	153 (63,8)	5	59

^{*} dont : « fin de ttt » ; « ttt provisoire »

Suivi (3)

Corevih	TPE (n)	Durée effective du Ttt en jours, Moy [Min ;Max]			
		Pas arrêt prématuré	Arrêt prématuré	NR	
Nord	357	28 [26 ;36] n=115	5 [0 ;15] n=23	n=219	
Ouest	513	28 [27 ;31] n=139	3 [0 ;7] n=78	n=296	
Est*	398	28 [26 ;34] n=280	5 [0 ;17] N=95	n=23	
Centre**	443	32 [26 ;62] n=98	6 [1 ;23] N=38	n=307	
Sud	156	28 [28 ;30] n=59	6 [0 ;14] n=17	n=80	
Total	1867	N=691 (37,1)	N=251 (13,4)	925 (49,5)	

^{*} Pas arrêt prématuré ttt et durée non renseignée dans 251 cas : durée considérée = 28 J ?

^{**} Durée calculée (date arrêt vs date début ttt)

Suivi (4)

Corevih	TPE (n)	Survenue d'effets indésirables sous ttt, n (%)			
		Non	Oui	NR	
Nord	357	228	92	37	
Ouest	513	251	182	80	
Est	[398]		NR		
Centre	[443]		NR		
Sud	156	51	16	89	
Total	1026	530 (51,7)	290 (28,3)	206 (20,1)	

Suivi (5)

Corevih	Effets II	Intensité effets indésirables, n (%)				
		faible	modéré	intense	NR	
Nord	92	51	34	6	1	
Ouest	182	30	18	1	133	
Est	NR					
Centre		NR				
Sud	16	13	3			
Total	290	94 (32,4)	55 (19,0)	7 (2,4)	134 (46,2)	

Suivi (6)

Corevih	CS JO (SAU ou Reft)	TPE+ JO	Eval ou rééval Reft (TPE+ J0)	Durée effective TPE renseignée	CS renseignée ≥M1 (TPE+ J0)	Bio renseignée ≥M1 (TPE+ J0)
Nord	373	357	357	138	115	95
Ouest	561	513	511	217	120	157
Est	601	398	398	375	36	239
Centre	500	443	443	136	125	124
Sud	183	156	156	76	108	108
Total	2218	1867	1865	942/1867 (50,5%)	504/1867 (27,0%)	723/1867 (38,7%)

Conclusions

- Partenaire occasionnel dans 3/4 des cas ; absence de préservatif dans près de la 1/2 des cas
- Partenaire source VIH+ dans près de 10% des cas
- Choix du TPE non unifié
- 17% ont 1 ATCD de TPEcandidats à la PrEP+++
- Continuer la surveillance en IDF pour évaluer l'évolution au regard de la diffusion de la PrEP
- Simplifier la fiche de recueil pour faciliter notamment le recueil des informations de suivi

Remerciements

- Les services référents et SAU volontaires
- Gwenn Hamet, Bénédicte Montoya, Malikhone Chansombat, José-Luis Lopez Zaragoza, Françoise Churaqui, Wiliam Tosini, Rachid Agher, Nadia Valin, Marie-Gisèle Lebrette
- Les membres de la commission AEV InterCorevih IdF