

ANALYSE DESCRIPTIVE DES PATIENTS VIH CO-INFECTES VHC SUIVIS SUR LE TERRITOIRE DU COREVIH IDF OUEST

J.Gerbe⁽¹⁾, H.Lepinay⁽¹⁾, T.Akpan⁽²⁾, D.Bornarel⁽¹⁾, V.Daneluzzi⁽³⁾, J-J.Laurichesse⁽⁴⁾, B.Montoya⁽¹⁾, E.Mortier⁽⁵⁾, M.de Laroche^(6,7), S.Souak⁽¹⁾, E.Rouveix^(1,6,7), P.de Truchis^(1,6,7)

⁽¹⁾ COREVIH Ile de France Ouest, ⁽²⁾ CH Meulan-les-Mureaux (78), ⁽³⁾ CH Max Fourestier (92), ⁽⁴⁾ CH François Quesnay (78), ⁽⁵⁾ APHP Hôpital Louis Mourier, Colombes (92), ⁽⁶⁾ APHP GH Paris-Ile de France Ouest (92), ⁽⁷⁾ Université Versailles St Quentin, UFR Simone Veil (78)


Objectifs : Décrire la population des personnes vivant avec le VIH (PvVIH) co-infectées par le VHC suivies sur le territoire du COREVIH Ile-de-France (IDF) Ouest avec un focus sur les nouvelles contaminations.

Méthodes : Analyse rétrospective des données de la base régionale DOMEVIH du COREVIH IDF Ouest de 2012 à 2017.

Résultats :


- 1094 PvVIH co-infectées VHC (PvVIH/VHC) représentent 14% des 7629 PvVIH de la base régionale :
- En 2017 : - 69% sont des hommes, différent de la FA globale 2017 : 55% d'hommes, 41% de femmes et 4% de PvVIH transgenres.
- 77% connaissent leur séropositivité pour le VIH depuis plus de 16 ans (contre 40% dans la FA globale),
- 34% sont au stade SIDA (contre 25% pour la FA globale).

Pays de naissance




Les PvVIH porteuses du VHC sont majoritairement nées en France 66% et en Afr Nord 11%
- différent de la FA globale 2017 : 40,5% nés en France, 39% en Afr SS et 7% en Afr Nord

Age ≥ 50 ans




les PvVIH porteuses du VHC sont plus âgées : 76% ont plus de 50 ans
- différent de la FA globale 2017 : 49% ≥ 50 ans

Mode de transmission du VIH




Le mode de transmission VIH est l'usage de drogue injectable dans 58% des cas (vs 64% en 2012), sexuel dans 35% (20% hétérosexuel et 15% homo/bisexual HS-BS) des cas (vs 29% en 2012).

- 98% des PvVIH/VHC reçoivent un traitement antirétroviral en 2017 ; 92% des PvVIH/VHC traités depuis > 6 mois ont une CV < 50 cp/ml – identique à la FA globale
- 67,5% des PvVIH/VHC ont reçu un traitement contre le VHC (dont 62,5% un DAA)
- Fin 2017, 90% des PvVIH/VHC sont guéries du VHC. 55 patients restaient à traiter (43 naïfs et 8 en échec de traitement ou nouvelle infection) soit 8% des PvVIH/VHC.
- 5% des PvVIH/VHC sont co-infectées par le virus de l'hépatite B et porteuses de l'Antigène HBs
- Pour 59 PvVIH, l'infection VHC est survenue au cours du suivi de l'infection VIH, dans un délai médian de 10 ans [0-29].
- Ces nouvelles contaminations VHC chez les PvVIH augmentent depuis 2012 et concernent les hommes à 83%, HS-BS à 69%, nés en France à 71%, dépistés à la phase aigüe de l'infection.




Age par Sexe au dépistage VHC


L'âge médian est de 43,0 ans [21-64]



Nombre de PvVIH/VHC par Sexe et année de dépistage VHC



PCR au dépistage par sexe et mode de transmission du VHC



Conclusion :

La population des PvVIH/VHC est masculine, plus âgée que l'ensemble des PvVIH suivies, et à un stade plus avancé de l'infection VIH. Fin 2017, la majorité des PvVIH/VHC sont guéris du VHC. Le nombre de contamination par le VHC principalement par usage de drogue injectable, diminue au cours du temps pour laisser place à une contamination par voie sexuelle. Le nombre de nouvelles contaminations augmente chez les PvVIH suivies contaminées par voie HS-BS et souligne la nécessité de la prévention auprès de cette population.