



Ce test ne détecte pas les autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST)

Les IST multiplient le risque d'être infecté par le VIH.

N'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant qui vous remettra une ordonnance. Vous pourrez ainsi compléter votre dépistage du VIH par celui des hépatites B, C, de la syphilis et autres IST.

Vous pouvez également vous rendre dans un CDAG/CIDDIST (Centre d'Information, de Dépistage des Infections Sexuellement Transmissibles).

Centre de dépistage anonyme et gratuit.



Agir rapidement après un risque ?

Vous pensez avoir pris un risque très récent ?

En cas de prise de risque (rupture de préservatif, rapport sexuel non protégé), il est recommandé de se rendre aux urgences des hôpitaux (au mieux dans les 4 heures, au plus tard dans les 48 heures) afin d'évaluer avec un médecin l'utilité d'un Traitement Préventif Post Exposition (TPE).

Ce traitement a pour objectif de réduire le risque d'infection par le VIH.



Se faire dépister aussi pour enrayer l'épidémie !


Nous savons désormais qu'une personne dépistée tôt et mise sous traitement ne transmet plus le virus et permet d'allonger sa durée et sa qualité de vie. Le dépistage devient ainsi plus que jamais un outil de prévention clé essentielle pour enrayer l'épidémie.

Pourtant en France environ 30 000 personnes ignorent qu'elles sont séropositives. **Sans le savoir, elles mettent en danger leur santé et peuvent transmettre le VIH.**

Pour obtenir toutes les informations et le soutien dont vous pourriez avoir besoin, n'hésitez à joindre :



Test rapide du VIH à résultat immédiat



Document réalisé par le Corevih Ile-de-France Ouest.



Comité de coordination de lutte contre l'infection due au VIH

Le Corevih, c'est la réunion de tous les acteurs de la lutte contre le sida qui assurent collectivement la prise en charge globale des personnes infectées par le VIH et la lutte contre l'infection.

Hôpitaux Universitaires Paris Ile-de-France Ouest
 CHU Ambroise Paré (AP-HP)
 Corevih Ile-de-France Ouest
 Service médecine interne
 9 avenue Charles de Gaulle
 92104 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex
 Tél : 01 49 09 59 58 - Fax : 01 49 09 56 49
 www.corevihouest.org

Réalisé par le Corevih IDF Ouest - 2013

Vous avez effectué un dépistage avec test rapide d'orientation diagnostique (TROD)

Ce test dépiste les infections par le VIH datant de plus de trois mois



Les tests de dépistage rapide du VIH sont-ils fiables ?

OUI, les tests de dépistage rapide atteignent une fiabilité maximale trois mois après l'infection à VIH.

Les tests utilisés en France sont approuvés par le Ministère de la Santé.

Ces tests rapides peuvent être réalisés par des associations de lutte contre le sida habilitées et formées.



Votre prise de risque est inférieure à 3 mois ?

Il est préférable de réaliser un test classique dans un centre de dépistage ou en laboratoire. Ce test permettra également de diagnostiquer, avec un délai plus court, une séroconversion.



Vous pensez avoir été en contact avec le VIH dans les 3 derniers mois précédant ce test ?

Il est conseillé de contrôler par un nouveau test trois mois après le dernier contact supposé avec le VIH pour être certain de ne pas être infecté.



Le résultat du TROD est négatif et vous n'avez pas eu de risques d'exposition au VIH dans les 3 derniers mois précédant ce test ?

Le résultat négatif signifie que vous n'êtes pas infecté par le VIH.



Le résultat du TROD est invalide ou indéterminé ?

Ceci arrive rarement et les raisons sont diverses. Dans ce cas, le test réalisé ne peut pas être interprété et il n'est pas possible de vous donner un résultat. Il faut alors effectuer un test classique.

Pour obtenir un résultat, vous pouvez vous rendre dans un laboratoire. Pour bénéficier d'une prise en charge, vous devrez avoir une ordonnance prescrite par un médecin.

Vous pouvez également vous rendre dans un centre de dépistage ANONYME ET GRATUIT (CDAG ou CIDDIST) sans ordonnance.



Le résultat du TROD est positif

Ce résultat signifie pour vous une très forte suspicion d'infection par le VIH.

Il est indispensable de confirmer ce test par un test classique avec prise de sang.

Seul un médecin pourra vous annoncer le résultat après la réalisation d'un test classique dans un centre de dépistage ou un laboratoire.

N'hésitez pas à vous rendre dans un centre de dépistage (SANS RENDEZ-VOUS. TEST ANONYME ET GRATUIT) ou consultez un médecin qui vous remettra une ordonnance pour une prise en charge médicale, si vous souhaitez faire le test dans un laboratoire en ville.

Dans l'attente du résultat de ce test, prenez les mesures de prévention (préservatif) pour vous protéger et protéger vos partenaires.

Pour obtenir les adresses et horaires d'ouverture des centres de dépistage les plus proches de chez vous, téléphonez à :

